



第三章

台灣目前常用吸入藥物 及吸入器圖鑑



台灣目前常用之吸入藥物分類及藥名請參考表 3-1。本章節也提供藥物及吸入器實體照片、商品名、學名、中文名、劑量與一般用法供使用者參考。部分藥物附有 QR code 可連結至衛教影片網站。

表 3-1. 台灣目前常用吸入藥物

短效乙二型刺激劑 (SABA)

備勞喘 Berotec (Fenoterol)
泛得林 Ventolin (Salbutamol)

短效乙二型刺激劑 (SABA) + 短效抗膽鹼藥物(SAMA)

冠喘衛 Combivent (Salbutamol + Ipratropium)
備喘全 Berodual (Fenoterol+ Ipratropium)

超長效乙二型刺激劑(Ultra-LABA)

昂舒 Onbrez (Indacaterol)
適維樂 Striverdi (Olodaterol)

長效抗膽鹼藥物(LAMA)

英克賜 Incruse (Umeclidinium)
吸補力 Seebri (Glycopyrronium)
適喘樂 Spiriva (Tiotropium)

固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑(ICS+LABA)

呼特康 Flutiform (Fluticasone propionate + Formoterol)
肺舒坦 Foster (Beclomethasone + Formoterol)
潤娃 Relvar (Fluticasone furoate + Vilanterol)
使肺泰 Seretide (Fluticasone propionate + Salmeterol)
吸必擴 Symbicort (Budesonide + Formoterol)

雙長效合併支氣管擴張劑 (Fixed dual LABA+LAMA)

安肺樂 Anoro (Vilanterol + Umeclidinium)
適倍樂 Spiolto (Olodaterol + Tiotropium)
昂帝博 Ultibro (Indacaterol + Glycopyrronium)

吸入型類固醇(ICS)

保衛康 Alvesco (Ciclesonide)
帝舒滿 Duasma (Budesonide)
輔舒酮 Flixotide (Fluticasone propionate)
可滅喘 Pulmicort (Budesonide)

短效乙二型刺激劑 (SABA)

商品名：**Berotec MDI**

學名：Fenoterol

中文名：備勞喘 定量吸入器

劑量：100 µg/劑

一般用法：需要時吸入一劑



短效乙二型刺激劑 (SABA)

商品名: **Ventolin MDI**

學名: Salbutamol

中文名: 泛得林 定量吸入器

劑量: 100 µg / 劑

一般用法: 需要時吸入一劑



短效乙二型刺激劑 + 短效抗膽鹼藥物 (SABA+SAMA)

商品名: **Berodual**

學名: Fenoterol + Ipratropium

中文名: 備喘全 定量噴霧液

劑量: 50/20 µg / 劑

一般用法: 需要時吸入一劑或每 6-8 小時
吸入一劑



超長效乙二型刺激劑 (Ultra-LABA)

商品名: **Onbrez Breezhaler**

學名: Indacaterol

中文名: 昂舒 吸入器

劑量: 150 µg / 劑

一般用法: 每日吸入一劑



超長效乙二型刺激劑 (Ultra-LABA)

商品名: **Striverdi RespiMat**

學名: Olodaterol

中文名: 適維樂 舒沛噴 吸入器

劑量: 2.5 µg / 劑

一般用法: 每日一次, 每次 2 噴



操作影片連結

長效抗膽鹼藥物 (LAMA)

商品名: **Incruse Ellipta**

學名: Umeclidinium

中文名: 英克賜 易利達 乾粉吸入器

劑量: 55 mcg / 劑

一般用法: 每日吸入一劑



長效抗膽鹼藥物 (LAMA)

商品名: **Seebri Breezhaler**

學名: Glycopyrronium

中文名: 吸補力 吸入器

劑量: 50 µg / 劑

一般用法: 每日吸入一劑



長效抗膽鹼藥物 (LAMA)

商品名: **Spiriva Respimat**

學名: Tiotropium

中文名: 適喘樂 舒沛噴 吸入器

劑量: 2.5 µg / 劑

一般用法: 每日一次, 每次 2 噴



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與 長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商品名: **Flutiform MDI**

學名: Fluticasone propionate + Formoterol

中文名: 呼特康 定量吸入器

劑量: 25/5 µg / 劑

一般用法: 每 12 小時, 吸入 1-2 劑



固定合併吸入型類固醇與 長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商品名: **Relvar Ellipta**

學名: Fluticasone furoate + Vilanterol

中文名: 潤娃 易利達乾粉吸入器

劑量: 92/22 µg / 劑

一般用法: 每日吸入一劑



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與 長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商品名: **Seretide Accuhaler**

學名: Fluticasone propionate + Salmeterol

中文名: 使肺泰 準納吸入器 (胖胖魚吸入器)

劑量: 100/50; 250/50; 500/50 µg / 劑

一般用法: 每 12 小時, 吸入 1 劑



操作影片連結

固定合併吸入型類固醇與 長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商品名: **Foster MDI**

學名: Beclomethasone dipropionate +

Formoterol

中文名: 肺舒坦 定量吸入器

劑量: 100/6 µg / 劑

一般用法: 每 12 小時, 吸入 1-2 劑



固定合併吸入型類固醇與 長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商品名: **Seretide Evohaler MDI**

學名: Fluticasone propionate + Salmeterol

中文名: 使肺泰 定量吸入器

劑量: 50/25, 125/25, 250/25 µg / 劑

一般用法: 每 12 小時, 吸入 1-2 劑



操作影片連結



固定合併吸入型類固醇與 長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商品名: **Symbicort Turbuhaler**

學名: Budesonide + Formoterol

中文名: 吸必擴 都保吸入器

劑量: 160/4.5 µg / 劑

一般用法: 每 12 小時, 吸入 1-2 劑



固定合併吸入型類固醇與 長效乙二型刺激劑 (ICS+LABA)

商品名: **Symbicort Rapihaler MDI**

學名: Budesonide + Formoterol

中文名: 吸必擴 定量吸入器

劑量: 160/4.5 µg / 劑

一般用法: 每 12 小時, 吸入 1-2 劑



雙長效合併支氣管擴張劑 (Ultra-LABA+LAMA)

商品名: **Anoro Ellipta**

學名: Vilanterol + Umeclidinium

中文名: 安肺樂 易利達乾粉吸入器

劑量: 55/22 µg / 劑

一般用法: 每日吸入一劑



操作影片連結

雙長效合併支氣管擴張劑 (Ultra-LABA+LAMA)

商品名: **Spiolto Respimat**

學名: Olodaterol + Tiotropium

中文名: 適倍樂 舒沛噴 吸入器

劑量: 2.5/2.5 µg / 劑

一般用法: 每日一次, 每次 2 噴



操作影片連結

雙長效合併支氣管擴張劑 (Ultra-LABA+LAMA)

商品名: **Ultibro Breezhaler**

學名: Indacaterol + Glycopyrronium

中文名: 昂帝博吸入器

劑量: 110/50 µg / 劑

一般用法: 每日吸入一劑



操作影片連結

吸入型類固醇 (ICS)

商品名: **Alvesco MDI**

學名: Ciclesonide

中文名: 保衛康 治喘樂定量噴霧器

劑量: 160 µg / 劑

一般用法: 每日吸入 1 劑



吸入型類固醇 (ICS)


商品名：**Duasma MDI**

學名：Budesonide

中文名：帝舒滿 定量吸入器

劑量：200 µg / 劑

一般用法：每 12 小時，吸入 1-2 劑



吸入型類固醇 (ICS)

商品名：**Flixotide Evohaler MDI**

學名：Fluticasone propionate

中文名：輔舒酮 定量吸入器

劑量：50 µg / 劑

一般用法：每 12 小時，吸入 1-2 劑



吸入型類固醇 (ICS)

商品名：**Pulmicort Turbuhaler**

學名：Budesonide

中文名：可滅喘 都保吸入器

劑量：200 µg / 劑

一般用法：每 12 小時，吸入 1-2 劑

