



糞便檢體採檢說明

一、採檢注意事項：

1. 採檢前三天少吃肉類、含鐵質食物(菠菜、甘藍、花椰菜)。
2. 鐵劑及含鐵劑藥物會造成偽陽性,採檢前應禁食含鐵劑藥物及aspirin。
3. 大量維他命C或其他抗氧化物可能會造成偽陰性反應,採檢前應禁食。
4. 女性若遇生理期,請勿作糞便潛血反應檢查。
5. 勿用衛生紙或塑膠袋包糞便檢體。

二、採檢方法：

1. 可以便盆或坐式馬桶採檢,解便時儘量解在馬桶前端(斜面上,不要解在水中),若為蹲式馬桶則儘可能取未沾水部份之糞便。
2. 以便盒所附帶之杓子,取約半拇指頭大的糞便,連同杓子蓋緊於便盒中即可。
3. 請在採檢糞便的當日與檢驗單一併送至抽血櫃檯,非上班期間請送到七樓檢驗醫學科。

注意事項：

- ①請將收集好之檢體容器,儘速送交抽血櫃檯,非上班期間請送到七樓檢驗醫學科。
- ②如有疑問或不清楚之處,請撥電話詢問。
詢問時間：星期一至星期六 上午8:00-23:00
詢問電話：(02) 2431-3131 轉 2649、2650 (檢驗室)