

糞便培養採檢注意事項

一、糞便培養採檢注意事項和方法

- 沙門或志賀氏菌 (Salmonella , Shigella)糞便培養
將收集盒打開，以蓋上之小匙取 (約小指頭大小)之糞便，放入有紅色培養液之糞便培養收集瓶中，蓋緊蓋子。勿將紅色培養液倒掉，連同檢驗單，儘速送交抽血檢驗室。
- 曲狀桿菌 (Campylobacter) 糞便培養
以專用之棉棒(Cary-Blair transport swab)沾取少許糞便，放入糞便培養傳送管中。並標示病人姓名與病歷號於傳送管上。將收集好之糞便檢體傳送管，連同檢驗單，儘速送交抽血檢驗室。
- 困難梭狀桿菌 (Cl.difficile)糞便培養
以厭氧棉棒沾取少許糞便，放入糞便培養傳送管中。並標示姓名病歷於傳送管上。將收集好之糞便檢體傳送管，連同檢驗單，儘速送交抽血檢驗室。
- Culture for Vibrio.sp.，當懷疑是 Vibrio 感染，可將檢體直接放入無菌痰盒或無菌尿杯或 Cary-Blair transport swab 專用棉棒送檢，並於檢驗單上註明之。
- Culture for E.coli O157：送檢方式同 Salmonella&Shigella。
- Stool culture for VRE：送檢方式同 Salmonella&Shigella。
- 如要求作特殊細菌(如 Aeromonas、Plesiomonas、Staphylococcus)，送檢方式同 Salmonella&Shigella。

二、諮詢服務電話(週一~週五 08:30~17:00)

林口院區：(03)3281200 轉 2540、2527
基隆院區：(02)24313131 轉 2649、2650
嘉義院區：(05)3621000 轉 2150、2253
雲林院區：(05)6915151 轉 2185
高雄院區：(07)7317123 轉 2573、2571
桃園分院：(03)3196200 轉 2051、2052
土城院區：(02)22630588 轉 2858

長庚醫療財團法人檢驗醫學科編製
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。
著作權人：長庚醫療財團法人
32K L242 107 年
本院全球資訊網網址 <https://www.cgmh.org.tw/>

