



## 糞便培養檢體採檢說明

### □ 沙門或志賀氏菌(Salmonella , Shigella)糞便培養

將收集盒打開，用蓋上之小匙取(約小指頭大小)之糞便，放入有紅色培養液之糞便培養收集瓶中，蓋緊蓋子。

**注意:請勿將紅色培養液倒掉。**

### □ 曲狀桿菌(Campylobacter) 糞便培養

1. 以糞便培養專用之棉棒沾取少許糞便，最好選有黏液、膿或有組織碎片部份，放入檢體收集管中。
2. 小孩無法採集糞便時，可採集直腸檢體，以肥皂和水將肛門周圍洗淨，後用糞便檢體收集管之拭子插入肛門約3-5公分，輕輕旋轉，然後取出置於檢體收集管。

### □ 艱難梭狀桿菌(Cl.difficile)糞便培養

1. 以糞便培養專用之棉棒沾取少許糞便，最好選有黏液、膿或有組織碎片部份，放入檢體收集管中。
2. 小孩無法採集糞便時，可採集直腸檢體，以肥皂和水將肛門周圍洗淨，然後用糞便檢體收集管之拭子插入肛門約3-5公分，輕輕旋轉，然後取出置於檢體收集管。

### **注意事項：**

- ①請將收集好的檢體容器，儘速送交抽血櫃台，非上班期間請送到七樓檢驗醫學科。



基隆長庚紀念醫院  
檢驗醫學科

②如有疑問或不清楚之處，請撥電話詢問。

詢問時間：星期一至星期六 上午 8：00-23：00

詢問電話：(02) 2431-3131 轉 2649、2650 (檢驗室)

編號：PP0401-RN01