

骨折

◎台北長庚外傷及小兒骨科主治醫師 李偉群



現職

台北長庚助理教授級主治醫師

專長

兒童骨折、
髖關節發育不良、
脊椎側彎



骨折 (Fracture) 是指骨頭因為直接或間接的外力造成碎裂或變形。有相當多分類方法，最常見的是根據外觀分成閉鎖性與開放性骨折。閉鎖性骨折是骨折部位沒有與人體外部接觸，採固定治療即可逐漸癒合，受感染的機會很低。開放性骨折是骨折部位碰觸到體外，接觸到皮膚和環境中的細菌，受感染的機會高，需要立即清創使用抗生素，及暫時性的外固定治療。症狀方面，骨膜有密集的神經，因此會有嚴重的疼痛，並可併發出血、腫脹、和周圍神經、動靜脈的壓迫及損傷。其他嚴重的併發症包括：(1) 脊椎骨折有可能傷及脊髓，而造成癱瘓；(2) 長骨中的脂肪進入血液造成肺部或腦部的脂肪栓塞；(3) 老人骨折因久臥而發生譫妄和肺炎。治療方式分為內固定，即是開刀使用骨板骨釘固定骨折部位；或是使用外固定，即是用體外固定器固定骨折部位而讓骨折部位慢慢癒合。不管治療方式為何，只要沒有併發症如感染或缺血性壞死，約莫百日骨折處即可完成癒合過程而成功康復。◀