

何謂關節造影？

所謂的靜脈注射泌尿道攝影術，即是經由靜脈血管注射對比劑後，基於這些物質不能被身體吸收，而大部分由腎臟排出，再由輸尿管流入膀胱，故於不同時間間隔拍攝腹部、骨盆、或解尿後的X光照片，以診斷泌尿系統的疾病。

做此檢查會痛嗎？

會有類似肌肉注射之刺痛感，但檢查注射部會打局部麻醉劑，大幅減輕不適。

做此檢查做何種準備？

一般不必做任何準備，唯為避免很罕見之造影劑過敏反應，一般建議檢查前一餐最好禁食（可服用藥物）。

關節造影有何目的？

可診斷許多關節內及關節旁之疾病，如肌腱、韌帶斷裂、軟骨損傷、關節腔發炎、囊性病變、腫瘤等疾病。

關節造影一般需時多久？

視檢查部位大小及難易程度，病人配合度

而定。以最常見之肩關節造影為例約 20-30 分鐘左右即可完成。

關節造影病人本身姿勢為何？

一般為平躺即可，醫師祇在檢查部位消毒，鋪單後施以檢查，不必動到其它部位，病人本身不必有太多之移動。

關節造影安全嗎？有何併發症？

關節造影一般而言是一項非常安全之檢查，通常注射顯影劑照像後即可回家，不必住院。檢查完畢後通常會有較輕微之局部腫脹，在 1-2 天內會慢慢消退，不必服藥。極少部分病例會有合併關節感染、發炎，及對對比劑過敏之反應（如皮膚出疹、癢，喉頭水腫，嚴重者可能有血壓降低甚至休克之情形），唯發生之機率甚低且發生時本科醫師會立即予處理。

關節造影回家後若有不適該如何處理？

若前述之腫脹情形持續超過 3 天或出現局部紅腫及發燒、畏寒等症狀，請回來本院門診或急診由醫師診治（極少有此情形）。

一般而言關節造影是一簡單、快速、安全之檢查，如有任何疑問請於檢查前詢問本科醫

護人員，我們將熱忱為您解答。



放射診斷科衛教系列



如有任何問題可利用下列電話聯絡

- 林口院區 (03) 328-1200 轉 2570、3794
- 台北院區 (02) 2713-5211 轉 3663
- 基隆院區 (02) 2431-3131 轉 2210
- 桃園院區 (02) 319-6200 轉 2605
- 嘉義院區 (05) 362-1000 轉 2616
- 高雄院區 (07) 731-7123 轉 3033

長庚醫院放射診斷科 製訂

關節造影檢查 須知 Q&A



本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。
著作權人：長庚醫療財團法人

長庚紀念醫院 N??? 10×21cm 100.06

 長庚紀念醫院 編印