

什麼是上消化道鋇劑攝影檢查？

上消化道鋇劑攝影是經口服發泡劑並喝下鋇劑，再藉由X光攝影，使得食道、胃部、十二指腸及小腸的內腔能夠清楚顯影呈現。

為什麼要做上消化道鋇劑攝影檢查？

1. 偵測不明原因血便、腹痛。
2. 懷疑上消化道腫瘤，要找出正確的位置及侵犯的範圍。
3. 懷疑上消化道發炎性病變或潰瘍。
4. 懷疑上消化道阻塞、憩室、瘻管或其他病變時，偵測其正確的位置。如糜爛、線形潰瘍、疤痕、息肉等。

檢查注意事項

1. 上午接受檢查的病人，在排定檢查的前一天晚上，吃過晚餐之後，便開始禁食任何食物（包括水、香煙等），直到檢查完畢才可進食。
2. 排定在下午檢查者，應至少禁食六小時以上。
3. 懷疑上消化道部份堵塞者，須事先放置鼻胃管，把胃內容物抽吸乾淨。
4. 攜帶檢查單或相關資料至報到櫃檯辦理報

到手續。

5. 請家屬陪同一起到放射診斷科。

上消化道鋇劑攝影檢查的優點


- ▶ 單一對比鋇劑攝影檢查
 1. 該檢查可呈現上消化道不正常狹窄、充填缺損（如腔內大型腫塊）、外來性壓迫、瘻管及食道靜脈曲張等病變。
 2. 可顯示上消化道之生理異常狀況，如蠕動減少，張力（tonicity）消失、不正常攣縮等狀況。
- ▶ 雙重對比鋇劑攝影檢查
 1. 不必用大量的對比劑硫酸鋇，注入空氣或服用發泡劑就可達到胃部膨大之效果。
 2. 可顯示每一部位粘膜層之細微構造，包括早期病變如早期胃癌、表淺病變。

檢查後注意事項

1. 未來幾天的糞便會呈白色（鋇劑的排出）。
2. 多喝開水，以免便秘。
3. 按時回診，聽取報告。

上消化道鋇劑攝影檢查可能發生的併發症

1. 鋇劑之過敏反應極為罕見。
2. 因嘔吐而造成鋇劑及食物殘渣吸入肺，引起吸入性肺炎。
3. 最嚴重的併發症為胃部和腸管破裂，以致鋇劑漏至腹腔內，必須緊急手術處理，但此併發症極為罕見。
4. 其他極為罕見的併發症包括鋇劑進入腸內血管、細菌感染、腹痛、腹瀉等。





如有任何問題可利用下列電話聯絡

- 林口院區 (03) 328-1200 轉 2570、3794
- 台北院區 (02) 2713-5211 轉 3663
- 基隆院區 (02) 2431-3131 轉 2210
- 桃園院區 (02) 319-6200 轉 2605
- 嘉義院區 (05) 362-1000 轉 2616
- 高雄院區 (07) 731-7123 轉 3033

長庚醫院放射診斷科 製訂


本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。
著作權人：長庚醫療財團法人

Memo



放射診斷科衛教系列

上消化道鋇劑 攝影術



長庚紀念醫院 N529 10×21cm 104.01

 長庚紀念醫院 編印