

頭部穿刺傷處理流程

頭部穿刺傷

- (1) 破傷風類毒素
- (2) 給予抗生素(oxacillin)
- (3) 知會神經外科

子彈

刺傷

- (1) 呼吸道插管
- (2) 建立靜脈途徑
- 給予生理食鹽水(1-2 公升)

- (1) 勿嘗試移除武器
- (2) A, B, C
- (3) 評估昏迷指數(GCS)

- (1) 神經學狀況逐漸惡化
- (2) 瞳孔放大
- (3) 肢體半癱

腦部電腦斷層

照會神經外科

手術室

(+) 及穩定的血壓心跳

(-)

- (1) Mannitol 快速給予 1g/kg
- (2) Phenytoin 初始劑量 18mg/kg

- (1) 腦部電腦斷層
- (2) 照會神經外科
- (3) 剃頭

符合開顱手術之適應症

開顱手術之適應症:

- 1) GCS 3-5 時大片的大腦實質外血腫(?)
- 2) GCS 6-8 時沒有經腦室的傷害、雙側大腦傷害或多處明顯的優勢大腦傷害
- 3) GCS 9-15

不可進行開顱手術之條件(符合全部):

- 1) 初始評估 GCS>10
- 2) 在受傷的 6 小時內進行檢查
- 3) 進入的傷口直徑小於 2 公分
- 4) 沒有出口處傷口
- 5) 沒有腦實質外出血
- 6) 沒有正在擴大的腦內血腫以及血腫直徑小於 4 公分

(+)

(-)

加護病房

手術室

GCS 14, 15

GCS ≤ 13

觀察

顱內壓偵測(±)